

ZALECENIA INSPEKCIJ WETERYNARYJNEJ



• **Objawy kliniczne** ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i różnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakazów towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

- depresja;
- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
- objawy nerwowe;
- zasinienie i obrzęk grzebienia i dziwonków;
- silne trzęwienie, obrzęk zatok podoczołowych, kichanie;
- duszność;
- biegunka.

Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości **mogą wystąpić objawy** ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (**woda do picia**) z migrującymi **ptakami dzikimi**, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną **paszę, sprzęt, środki transportu**. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa **człowiek**. Rozprzestrzenianie z wirusem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.

DLA HODOWCÓW DROBIU

- ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
- trzymanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia),
- przechowywanie paszy, w tym zielonki w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,
- karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków,
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą ze zbiorników wodnych i rzek, zgłaszanie lekarzowi weterynarii spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed każdym wejściem do kurnika i każdym wjazdem na teren fermy/gospodarstwa oraz dezynfekcja pojazdów,
- zakaz wstępu na fermę osobom nieupoważnionym,
- używanie odzieży ochronnej przez osoby mające kontakt z drobiem,
- pracownicy ferm drobiu nie mogą mieć kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami,
- przestrzeganie zasad higieny osobistej – częste mycie rąk wodą z mydłem,

DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp dzikich ptaków,
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem.

